



EHEC?

DR.SCHNELL hat die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zur Hygiene.

Gerne informieren wir Sie über das „Enterohämorrhagische Escherichia coli EHEC“ und die erforderlichen Maßnahmen. Die Ausbreitung der aktuellen EHEC-Epidemie wird vom Robert-Koch-Institut als alarmierend eingeschätzt, weil die Erkrankungen auffällig oft einen schweren Verlauf mit Nierenversagen nehmen.

Die gute Nachricht zuerst: in allen Fragen rund um Maßnahmen und Produkte zu diesem brisanten Thema stehen wir Ihnen kompetent zur Seite und freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können.

- Ihre DR.SCHNELL Fachberater
- Ihre DR.SCHNELL Hotline 089 / 35 80 617

Was Sie über EHEC wissen sollten:

Wie erfolgt eine Infektion mit EHEC?

Möglich ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch bei mangelnder Hygiene oder über kontaminierte Lebensmittel. Es kommen auch andere Übertragungswege infrage, wie etwa Trink- und Badewasser. Noch ist die Ursache für die erhöhten Infektionszahlen aber völlig unklar.

Wie sehen die Vorbeugemaßnahmen aus? Was ist zu tun, wenn in einem Objekt Mitarbeiter, Besucher, Bewohner/Verbraucher oder Patienten an EHEC erkrankt sind?

1. Pflege und Hauswirtschaft

- Flächendesinfektion aller kontaminierten und bewohnernahen Kontaktflächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt
- Konsequente und regelmäßige Händehygiene wie Waschen und Desinfizieren

2. Küchen

- Strikte Einhaltung der Hygienevorschriften hinsichtlich Temperaturvorgaben bei der Zubereitung und Ausgabe der Speisen
- Gründliches Waschen oder Schälen von Obst und Gemüse
- Tägliche Desinfektion der Flächen und Griffbereiche
- Konsequente und regelmäßige Händehygiene

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE

EHEC?

DR.SCHNELL hat die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zur Hygiene.

Wie und mit welchen Produkten erfolgt die Desinfektion?

Da es sich bei dem Erreger um ein Bakterium handelt, sind die Desinfektionsmaßnahmen mit einem VAH- bzw. DVG-gelisteten Desinfektionsmittel aus dem Hause DR.SCHNELL durchzuführen.

1. Pflege und Hauswirtschaft

DR.SCHNELL Produkt	Produktart/Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
DESIFOR FORTE AF	Flächendesinfektionsreiniger VAH-gelistet (hohe Belastung mit Mechanik)	1,00 % 0,50 % 0,25 %	15 Minuten 60 Minuten 4 Stunden
DESIFOR B	Flächendesinfektionsreiniger VAH-gelistet (geringe Belastung mit Mechanik)	2,00 % 1,50 %	15 Minuten 60 Minuten
DESIFOR QUICK PLUS	Schnelldesinfektionsmittel für Flächen VAH-gelistet (hohe Belastung ohne Mechanik)	Konzentriert	5 Minuten
SEPTODERM HÄNDE	Händedesinfektionsmittel VAH-gelistet	Konzentriert	30 Sekunden
ARIEL Professional Pulver	Hygienevollwaschmittel VAH-gelistet	2g/l Flotte 1:5 60°C	15 Minuten

2. Küche

DR.SCHNELL Produkt	Produktart/Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
DESIFOR A	Flächendesinfektionsreiniger DVG-gelistet (bei 20°C, belastet)	3,00%	30 Minuten
DESIFOR FORTE AF	Flächendesinfektionsreiniger DVG-gelistet (bei 20°C, belastet)	0,50 % 0,75 %	60 Minuten 30 Minuten
DESIFOR QUICK PLUS	Schnelldesinfektionsmittel für Flächen DVG-gelistet (bei 20°C)	Konzentriert	30 Minuten Laut Gutachten wirksam nach 5 Minuten
SEPTODERM HÄNDE	Händedesinfektionsmittel VAH-gelistet	Konzentriert	30 Sekunden
CIMOSOFT	Hygienische Händewaschung VAH-gelistet	Konzentriert	30 Sekunden

In welchen Fällen sind ausschließlich RKI-gelistete Desinfektionsmittel einzusetzen?

RKI (A/B)-gelistete Produkte sind ausschließlich bei einer behördlich angeordneten Desinfektion einzusetzen.

Notfallpläne und Sicherheitsdatenblätter?

- Notfallpläne können Sie über unser **Service-Center Vertrieb** abrufen: 089 / 35 06 08 0 oder servicecentervertrieb@dr-schnell.de
- Die EU-Sicherheitsdatenblätter stehen Ihnen wie gewohnt über unsere Homepage www.dr-schnell.de zur Verfügung.

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE